

PEPTAMEN[®]



Destinată pacienților malnutriți sau cu risc de malnutriție, cu tulburări de absorbție și/sau digestie, de exemplu:

- intoleranță la alimentația enterală de cauză neprecizată
- ineficiența nutriției enterale cu formule polimerice
- tranziția de la nutriția parenterală la cea enterală
- nutriție combinată parenterală și enterală
- sindrom de malabsorbție refractar la tratament și/sau diaree cronică
- golire gastrică întârziată
- boli inflamatorii intestinale (BII)
- sindrom de intestin scurt
- fistule intestinale
- enterită postradică
- pancreatită
- afecțiuni hepatice

- Normoproteic: 16% din energie provenită din proteine
- Proteine 100% din zer, parțial hidrolizate
- Normocaloric: 1 kcal/ml
- Osmolaritate scăzută: 220 mOsm/l


SCHEMĂ ORIENTATIVĂ DE ADMINISTRARE A DIETEI^{1*}

Zona de administrare	Mod de administrare	Ziua I	Ziua II	Ziua III	Ziua IV	Zilele următoare
Stomac*	Bolus	6 x 50ml	creștere treptată a bolusului cu 25-50 ml/doză**			max. 6-8 doze pe zi, până la 300 ml fiecare
	Perfuzie continuă	20-50 ml/oră	50-70 ml/oră	70-90 ml/oră	90-110 ml/oră	110-120 ml/oră
Duoden*	Perfuzie continuă	10-20 ml/oră în primele 12 ore; 20 ml/oră în următoarele 12 ore	30-40 ml/oră	50-60 ml/oră	70-80 ml/oră	max. 100-120 ml/oră

* Schema trebuie adaptată în funcție de starea clinică a pacientului și de toleranța digestivă
 ** doar în condițiile unei toleranțe bune și în absența stazei gastrice

Conținut ridicat de MCT

70% din fracția lipidică, pentru a facilita absorbția și a îmbunătăți toleranța²



Normoproteic

100% proteine din zer parțial hidrolizate, pentru a facilita absorbția și a îmbunătăți toleranța^{3,4}

Peptamen*			
Valori nutriționale		100 ml	500 ml
Valoare energetică	kJ	421	2105
	kcal	100	500
Lipide	g	3,7	18,5
din care:			
- acizi grași saturați	g	2,6	13
- MCT	g	2,6	13
- acizi grași	g	0,22	1,1
- acizi grași	g	0,5	2,5
- omega-3	mg	60	300
Carbohidrați	g	12,7	63,5
din care:			
- zaharuri	g	0,48	2,4
- lactoză	g	<0,20	-
Proteine	g	4,0	20
Sare (=Na × 2,5)	g	0,18	0,9
Minerale			
Sodiu	mg	74	370
Potasiu	mg	115	575
Clorură	mg	67	335
Calciu	mg	50	250
Fosfor	mg	50	250
Magneziu	mg	20	100
Fier	mg	1,1	5,5
Zinc	mg	1,0	5,0
Cupru	mg	0,11	0,55

Peptamen*			
Valori nutriționale		100 ml	500 ml
Minerale			
Mangan	mg	0,23	1,15
Fluorură	mg	0,09	0,45
Seleniu	μg	6,3	31,5
Crom	μg	6,5	32,5
Molibden	μg	11	55
Iod	μg	14	70
Vitamine			
Vitamina A	μg	119	595
Vitamina D	μg	1,1	5,5
Vitamina E	mg	1,5	7,5
Vitamina K	μg	6,6	33
Vitamina C	mg	14	70
Tiamină (B1)	mg	0,15	0,75
Riboflavină (B2)	mg	0,15	0,75
Niacină	mg / mg NE	0,67 / 2,2	3,4 / 11
Vitamina B6	mg	0,21	1,05
Acid folic	μg	28	140
Vitamina B12	μg	0,25	1,25
Biotină	μg	3,6	18
Acid pantotenic	mg	0,65	3,25
Colină	mg	21	105
Taurină	mg	9,5	47,5
L-carnitină	mg	9,1	45,5
Conținut de apă: 85,3 g/100 ml			
Osmolaritate: 220 mOsm/l			

Ingrediente

Apă, maltodextrină, proteine din zer hidrolizate (din lapte), trigliceride cu lanț mediu (MCT), ulei de soia, săruri minerale (fosfat de sodiu, citrat de calciu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, citrat de sodiu, citrat de potasiu, clorură de sodiu, oxid de magneziu, fosfat de calciu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat de mangan, sulfat de cupru, fluorură de sodiu, iodură de potasiu, clorură de crom (III), molibdat de sodiu, selenat de sodiu), emulgatori (lecitină din soia, E471), stabilizatori (E412, E407), vitamine (C, E, niacină, acid pantotenic, B6, A, tiamină, riboflavină, acid folic, K, D, biotină), clorură de colină, taurină, L-carnitină.

Produs fără gluten. Sterilizat UHT. Ambalat în atmosferă protectoare.

Referințe:

1. Interna Szczeklika. Manual de boli interne, Medycyna Praktyczna, Cracovia, 2017, pp. 2650-2655
2. Qiu C. et al. Formula enterală modificată din punct de vedere lipidic îmbunătățește toleranța nutriției la pacienții critici: studiu randomizat multicentric, simplu-orb. JPEN J Parenter Enteral Nutr. iulie 2017; 41(5): 785-795
3. Huppertz T. et al. Coagularea proteinelor din lapte în condiții gastrice: o revizuire. International Dairy Journal 2021; 113, art. 10488
4. Liu MY et al. Formula enterală pe bază de peptide îmbunătățește toleranța și rezultatele clinice la pacienții supuși chirurgiei abdominale comparativ cu o formulă cu proteine intacte. World J Gastrointest Surg 2016; 8(10): 700-705

Material destinat profesioniștilor din domeniul sănătății. Aliment destinat unor scopuri medicale speciale. A se utiliza sub supraveghere medicală.
Peptamen: pentru managementul dietetic al malnutriției sau al riscului de malnutriție la pacienții cu tulburări de absorbție și/sau digestie.